

CYDOME 30 SC

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

PYRACLOSTROBIN, DIFENOCONAZOLE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ESTROBILURINA, TRIAZOL
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC	Pyraclostrobin: 11 Difenoconazole: 3

MODO DE ACCIÓN

CYDOME® 30 SC es un fungicida que combina la acción preventiva del pyraclostrobin con el efecto curativo del difenoconazole. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada inhibiendo la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1, la demetilación del esteroles y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo. **CYDOME® 30 SC** es absorbido por las hojas con fuerte translocación translaminar y movimiento acropetal.

USOS PARA EL SALVADOR:

USOS		
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Arroz Oryza sativa	Quemado del arroz Pyricularia oryzae Mancha naranja Gaeumannomyces spp. Complejo manchado del grano Alternaria Alternaria solani Curvularia Curvularia lunata Piricularia Pyricularia oryzae Cercospora Cercospora oryzae	0.3 – 0.6 L/ha (0.21 – 0.42 L/mz)
Tomate Solanum lycopersicum Berenjena Solanum melongena Chile pimiento Capsicum annuum	Oidium Leveillula taurica Pudrición gris Botrytis cinerea Alternaria Alternaria solani	0.6 L/ha (0.42 L/mz)
Papa Solanum tuberosum	Tizón temprano Alternaria alternata	0.6 L/ha (0.42 L/mz)

Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Mancha del peral <i>Stemphylium vesicarium</i> Roya del espárrago <i>Puccinia asparagi</i>	0.3 – 0.6 L/ha (0.21 – 0.42 L/mz)
Arveja <i>Pisum sativum</i> Frijol / Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i>	Oidiosis <i>Erysiphe betae</i>	
Maíz <i>Zea mays</i>	Mancha negra del maíz <i>Phyllachora maydis</i>	
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya del cafeto <i>Hemileia vastatrix</i>	
Fresa <i>Fragaria vesca</i>	Podredumbre gris o Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	
Cebolla <i>Allium cepa</i> Cebollín <i>Allium fistulosum</i> Ajo <i>Allium sativum</i>	Mancha del peral <i>Stemphylium vesicarium</i>	
Frutales	Oidium <i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i>	
Banano y plátano <i>Musa spp.</i>	Mancha del fruto <i>Macrophoma musae</i>	0.4 – 0.6 L/ha (0.28 – 0.42 L/mz)
Brócoli <i>Brassica oleracea var. Itálica</i> Repollo <i>Brassica oleracea var. capitata</i> Coliflor <i>Brassica oleracea var. Botrytis</i> Col de Bruselas <i>Brassica oleracea var. gemmifera</i> Rábano <i>Raphanus sativus</i>	Mancha negra <i>Alternaria brassicae</i>	0.3 – 0.6 L/ha (0.21 – 0.42 L/mz)
Zanahoria <i>Daucus carota</i> Apio <i>Apium graveolens</i> Perejil <i>Petroselinum crispum</i> Cilantro <i>Coriandrum sativum</i>	Tizón foliar <i>Alternaria dauci</i> Oidio <i>Erysiphe polygoni</i> Oidium <i>Leveillula taurica</i> Podredumbre gris o Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Calabaza <i>Cucurbita maxima</i> Güisquil <i>Sechium edule</i>	Cenicilla o Mildiu Polvoriento <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	0.6 L/ha (0.42 L/mz)

PRESENTACIONES

1 L, 250 ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.