

TOTEM 60 SL

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

2,4 - D

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	FENOXI
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 3
USOS	Herbicida
GRUPO HRAC	4

MODO DE ACCIÓN

TOTEM® 60 SL es un herbicida selectivo para control de malezas de hoja ancha. Actúa por translocación vía floema a lugares en donde hay mayor consumo de alimentos. La absorción también se efectúa por las raíces, transportándose por la savia hacia las zonas de mayor actividad metabólica.

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Bledo <i>Amaranthus spp</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Siempre viva <i>Commelina diffusa</i>	1.5 – 2.0L/ha (1.0 – 1.5L/mz)	La aplicación debe efectuarse después del macollamiento pero antes que se inicie la floración.
Maíz <i>Zea mays</i>	Escobillo <i>Sida spp.</i> Coyolillo <i>Cyperus sonchus</i> Tomatillo <i>Solanum americanum</i> Flor amarilla <i>Bidens pilosa</i> Lechuguilla <i>Sonchus oleraceus</i> Mostaza <i>Brassica campestris</i> Rabanillo <i>Raphanus raphanistrum</i>	1.5 – 2.0L/ha (1.0 – 1.5L/mz)	No se debe efectuar aplicación postemergente en suelos arenosos cuando el maíz tiene una altura de 24 cm, ni tampoco cuando se cultive para la producción de semilla híbrida.
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>		2.5 – 4.5L/ha (1.75 – 3.0L/mz)	Aplicar inmediatamente después de plantarse o antes que retoñen los brotes.
Café <i>Coffea arabica</i>		1.5 – 2.5L/ha (1.0 – 1.75L/mz)	La aplicación no debe tocar el follaje ni el tronco del cafeto.
Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>		0.6 – 1.0L/ha (0.4 – 0.7L/mz)	Aplicar cuando la planta tenga una altura de 15 cm.
Pastizales		1.25 – 2.0L/ha (0.9 – 1.5L/mz)	Las leguminosas forrajeras pueden ser dañadas por el herbicida especialmente si se aplica cuando la temperatura es elevada. No permitir que los animales se alimenten del pasto tratado durante 3 semanas después del tratamiento.

PRESENTACIONES

500ml, 1 L, 3.5 L, 18 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.