

ACTINEB 18.7 WG

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

PYRACLOSTROBIN + DIMETHOMORPH

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ESTROBILURINA, MORFOLINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC	Pyraclostrobin: 11 Dimethomorph: 40

MODO DE ACCIÓN

ACTINEB® 18.7 WG es un fungicida que combina la acción sistémica, traslaminar y preventiva del pyraclostrobin con el efecto protector y antiesporulante del dimethomorph. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada impidiendo la formación de energía al inhibir la respiración mitocondrial interrumpiendo el transporte de electrones, lo cual resulta en la cesación del crecimiento del hongo. Así mismo, inhibe los precursores de la celulosa ocasionando tanto el rompimiento de la pared celular como la formación de esporangiófo y esporas, desencadenando una actividad antiesporulante y la muerte del patógeno. **ACTINEB® 18.7 WG** posee una excelente actividad preventiva sobre deuteromicetos, basidiomicetos, ascomicetos y oomicetos.

USOS PARA GUATEMALA Y EL SALVADOR:

USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	1.5 – 2.0 kg/ha (1.05 – 1.4 kg/mz)	Aplicar cuando las condiciones climáticas sean propicias para el inicio de la infección y/o desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas. Se recomienda utilizar un volumen de agua de 300L/ha para aplicaciones terrestres, variando la dosis según el cultivo.
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>		
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu veloso <i>Peronospora destructor</i>		
Melón <i>Cucumis melo</i>	Mildiu veloso <i>Peronospora cubensis</i>		
Pepino <i>Cucumis sativus</i>			
Sandía <i>Citrullus lanatus</i>			
Zucchini <i>Cucurbita pepo</i>			
Chile <i>Capsicum annum</i>	Pudrición <i>Phytophthora capsici</i>		
Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	Mildiu veloso <i>Bremia lactucae</i>		
Brócoli <i>Brassica oleraceae</i> Var. <i>italica</i>	Mildiu del rocío <i>Peronospora parasitica</i>		
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>		
Rosa <i>Rosa sp.</i>	Mildiu veloso <i>Peronospora sparsa</i>		

PRESENTACIONES

5KG, 750G

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.